



## Hastalar için bilgilendirme formu

# TAGRISSO® (OSIMERTINIB) + kemoterapi

Kemoterapi ile birlikte TAGRISSO® alıyorsunuz. Aşağıda tedaviyle ilgili bilgiler özetlenmekte ve yan etkiler hakkında yararlı ipuçları verilmektedir. Lütfen her bir ilaç kutusuyla birlikte verilen prospektüste, TAGRISSO® ile ilgili bilgilerin yanı sıra kemoterapi prospektüslerine de başvurun.

### Neden TAGRISSO® + kemoterapi alıyorum?

Akciğer kanserinizde belirli bir genetik özellik (mutasyon) olduğu için size TAGRISSO® reçete edilmiş olabilir. Fiziksel sağlığınız izin verdiği için ek olarak kemoterapi alıyorsunuz.

### Kombinasyon tedavisi nasıl çalışır?

TAGRISSO®, günde bir kez tablet olarak (ağızdan) alınır. Kemoterapi iki bileşenden oluşur: Pemetrekset ve karboplatin veya sisplatin. Bunları, üç haftada bir damar içi yoluyla alacaksınız. Karboplatin veya sisplatin ile platin bazlı kemoterapi, maksimum dört kür, yani üç aydan sonra sona erer. TAGRISSO® ve pemetrekset daha sonra idame tedavisi olarak adlandırılan tedavide devam eder.



### TAGRISSO® nasıl alınır?



Günde bir kez 80 mg tablet alın. Tableti bol su ile bütün olarak yutun. Tableti **ezmeyin, bölmeyin** veya **çığnemeyin**.



Tableti, her gün aynı saatte alın.



Tableti aç veya tok karnına alabilirsiniz.

TAGRISSO® alma konusunda daha fazla bilgi edinmek için lütfen prospektüse bakın.

### Ne kadar TAGRISSO® almalıyım?

Önerilen doz, günde bir kez bir adet 80 mg tablettir. Gerekirse doktorunuz dozu günde bir kez, bir 40 mg tablete düşürebilir.

### Şu durumda ne yapmalıyım?

#### TAGRISSO® almayı unutursam?

- Tarihi not edin.
  - Bir sonraki dozu 12 saatten uzun bir süre içinde almanız gerekiyorsa, kaçırdığınızı fark eder etmez kaçırdığınız tableti alın. Bir sonraki dozun 12 saatten kısa bir süre içinde verilmesi gerekiyorsa tableti almayın.
  - Bir sonraki normal dozunuzu, her zamanki saatinde alın.
- #### ... çok fazla tablet alırsam?
- Derhal doktorunuz veya en yakın hastaneyle iletişime geçin.

## Olası yan etkiler nelerdir?

Tüm ilaçlar gibi, kombinasyon tedavisinin ilgili bileşenlerinin de yan etkileri olabilir, ancak bunlar herkeste görülmez.

Fark ettiğiniz yan etkiler burada veya prospektüste belirtilmiyor olsa bile olağandışı bir şey fark ederseniz veya herhangi bir rahatsızlık hissederseniz doktorunuza söyleyin. Aşağıdaki yan etkilerden bir veya daha fazlasını fark ederseniz derhal doktorunuza söyleyin:

- Öksürük ve ateş ile ani nefes darlığı
- Ciltte hedef işareti benzeri kırmızimsı renk değişimi veya dairesel yamalar, ciltte soyulma veya ülserler; bunlar ateş ve grip benzeri belirtilerden sonra ortaya çıkabilir
- Hızlı veya düzensiz kalp atışı, baş dönmesi, sersemlik, göğüs sıkışması, nefes darlığı veya bayılma
- Göz sulanması, ışığa hassasiyet, göz ağrısı, göz kızarıklığı veya görme bozukluğu
- Kalıcı ateş, morarma veya kanama eğiliminde artış, yorgunlukta artış
- Nefes darlığı, yorgunluk ve ayak bileklerinde şişme

Bilinen tüm yan etkilerin tam listesi için lütfen her bir ürünün prospektüsüne bakın.

## Kombinasyon tedavisinin çok yaygın yan etkileri\*



**İshal, bulantı veya kusma**



**Stomatit (oral mukozanın iltihaplanması ve ülserasyonu)**



**Yorgunluk**



**İştah kaybı**



**Trombosit ve beyaz kan hücrelerinin (lökosit, lenfosit veya nötrofiller) sayısında azalma, anemi, karaciğer enzimleri AST ve ALT'de artış ve kreatinin kan düzeylerinde artış**



**Cilt ve tırnak bozuklukları (ağrı, kaşıntı, kuru cilt, döküntü, kızarıklık)**

### Bilgi

Kural olarak, yan etkilerin sıklık ve şiddeti platin bazlı kemoterapinin tamamlanmasından sonra azalır.

\* Pivot çalışmadaki gönüllülerin en az %10'unda görülen yan etkiler.<sup>1</sup>

## Yan etkiler konusunda ne yapabilirim?

### İshal

- Sıvı kaybını telafi etmek için günde 2-4 litre içmelisiniz.
- Akut ishal durumunda, kolayca sindirilebilen yiyecekler (örneğin, muz veya pişmiş patates) tüketin.

### Bulantı ve kusma

- Sağlık ekibiniz bulantı ve kusmayı tedavi etmek için ilaçlar (antiemetikler) reçete edebilir.
- Gün boyunca küçük porsiyonlar halinde yemek yiyin.
- Meyveli buzlu şeker veya buz küpü emin.

### Oral mukoza iltihabı

- Doktorunuzun belirttiği şekilde ağız bakımı yapın.
- Ağızınızı en azından her öğünden sonra su veya tuzlu su (½-1 çay kaşığı/litre su) ile durulayın.

### Cilt değişiklikleri

- Cildiniz kuru, çatlamış veya pullanmışsa, ek cilt tahrişini önlemeye yardımcı olmak için kokusuz nemlendirici ve hatta yağ takviye edici cilt bakım ürünleri kullanın.

### Yorgunluk

- Egzersiz ve fiziksel aktivite, yorgunluk ve bitkinliği azaltmaya yardımcı olur. Bir "hareket uyarısı" ayarlayın ve her gün yürüyüşe çıkın. Kısa yürüyüşler son derece yeterlidir.
- Arkadaşlarınız ve ailenizin sunduğu yardımı kabul edin veya zorlu görevlerin halledilmesi konusunda destek isteyin.

## Başka neleri bilmem gerekiyor?

- TAGRISSO® alırken sarı kantaron (*Hypericum perforatum*) almayın.
- TAGRISSO® tedavisi sırasında, etkili doğum kontrol yöntemi kullanarak gebeliği önleyin. Hamileyseniz, hamile olabileceğinizi düşünüyorsanız veya hamile kalmayı planlıyorsanız derhal doktorunuza bilgilendirin.
- Doktorunuza danışmadan tedaviye ara vermeyin.

### Ek destek:

Farmasötik hizmetler hakkında bilgi (katılımcı eczaneniz tarafından ileri düzey ilaç danışmanlığı) burada bulunabilir:



Hastalık hakkında daha fazla bilgiyi burada bulabilirsiniz: [www.lungenkrebs.de](http://www.lungenkrebs.de)