



ورقة معلومات للمرضى

تاجريسو® (أوزيميرتينيب) +العلاج الكيميائي

أنت تتلقى تاجريسو® مع العلاج الكيميائي. في ما يلي تلخيص للمعلومات حول العلاج ويقدم نصائح مفيدة حول الآثار الجانبية. يُرجى أيضًا الرجوع إلى المعلومات الخاصة بعقار تاجريسو® في نشرة العبوة المرفقة مع كل علبة دواء، وكذلك نشرات العبوة الخاصة بالعلاج الكيميائي.

ما طريقة تناول عقار تاجريسو®؟

تناول قرصًا واحدًا 80 مجم مرة واحدة يوميًا. ابتلع القرص كاملاً مع الكثير من الماء. لا تطحن القرص أو تقسمه أو تمضغه.



تناول القرص في نفس الوقت كل يوم.



يمكنك تناول القرص مع الطعام أو بدونه.



لمزيد من المعلومات حول تناول عقار تاجريسو®، يُرجى الرجوع إلى نشرة العبوة.

ما جرعة عقار تاجريسو® التي يجب تناولها؟

الجرعة الموصى بها هي قرص واحد 80 ملجم مرة واحدة يوميًا. إذا لزم الأمر، قد يقلل طبيبك الجرعة إلى قرص واحد 40 مجم مرة واحدة يوميًا.

ماذا أفعل إذا...؟

... نسيت تناول تاجريسو®؟

- دَوِّن التاريخ.
- إذا كان موعد الجرعة التالية بعد أكثر من 12 ساعة، فتناول القرص الفائت فور تذكره. لا تتناول القرص إذا كان موعد الجرعة التالية بعد أقل من 12 ساعة.
- تناول جرعتك العادية التالية في الوقت المعتاد.
- ... تناولت عددًا كبيرًا جدًا من الأقراص؟
- اتصل بطبيبك أو توجه إلى أقرب مستشفى على الفور.

لماذا أتلقى تاجريسو® + العلاج الكيميائي؟

ربما تم وصف تاجريسو® لك لأن سرطان الرئة الذي تعاني منه لديه سمة جينية محددة (طفرة). أنت تتلقى العلاج الكيميائي بالإضافة إلى ذلك، لأن صحتك البدنية تسمح بذلك.

كيف تعمل توليفة العلاج؟

يؤخذ تاجريسو® على شكل قرص (فمويًا) مرة واحدة يوميًا. يتكوّن العلاج الكيميائي من مكونين: بيميتريكسيد وكاربولاتين أو سيسبلاتين. ستتلقى هذه الأدوية عن طريق الوريد كل ثلاثة أسابيع. ينتهي العلاج الكيميائي القائم على البلاتين مع كاربولاتين أو سيسبلاتين بعد أربع دورات كحد أقصى - أي ثلاثة أشهر. ثم يستمر تاجريسو® وبيميتريكسيد فيما يسمى بعلاج المداومة.

تاجريسو®،

يؤخذ عن طريق الفم، مرة واحدة يوميًا (80 مجم)

بيميتريكسيد،

يؤخذ عن طريق الوريد، كل 3 أسابيع (500 مجم/2م)

العلاج الكيميائي القائم

على البلاتين
(سيسبلاتين أو كاربولاتين)،
يؤخذ عن طريق الوريد،
كل 3 أسابيع

علاج المداومة
(الدورة 5 وما بعدها)

علاج الحث
(الدورات 1-4)

ما الآثار الجانبية المحتملة؟

كما هو الحال مع جميع الأدوية، قد تُسبب المكونات المختلفة لتوليفة العلاج آثارًا جانبية، على الرغم من أن ذلك لا يحدث مع جميع المرضى.

أخبر طبيبك إذا لاحظت أي شيء غير عادي أو شعرت بأي انزعاج، حتى إذا لاحظت آثارًا جانبية غير مذكورة هنا أو في نشرة العبوة. أخبر طبيبك على الفور إذا لاحظت واحدًا أو أكثر من الآثار الجانبية التالية:

- ضيق مفاجئ في التنفس مصحوب بالسعال والحمى
 - احمرار الجلد الذي يشبه الهدف أو رقع دائرية، تقشر الجلد أو القرحة، والتي قد تكون سبقتها حمى وأعراض تشبه أعراض الإنفلونزا
 - ضربات قلب سريعة أو غير منتظمة، أو دوخة، أو دوّار، أو ضيق في الصدر، أو ضيق في التنفس، أو إغماء
 - العيون الدامعة، أو الحساسية للضوء، أو ألم العين، أو احمرار العين، أو ضعف الرؤية
 - حمى مستمرة، تكدم أو ميل متزايد للزيف، زيادة التعب
 - ضيق التنفس، والتعب، وتورم الكاحلين
- للحصول على قائمة كاملة بجميع الآثار الجانبية المعروفة، يُرجى الرجوع إلى نشرة العبوة لكل منتج.

الآثار الجانبية الشائعة جدًا لتوليفة العلاج*

إسهال، أو غثيان، أو قيء



التهاب الفم (التهاب وتقرح الغشاء المخاطي الفموي)



الإرهاق



فقدان الشهية



انخفاض في عدد الصفائح الدموية وخلايا الدم البيضاء (الكريات البيضاء، أو اللبائحات، أو العدلات)، وفقر الدم، وزيادة في إنزيمات الكبد **AST** و **ALT**، وزيادة مستويات الكرياتينين في الدم



اضطرابات الجلد والأظافر (ألم، حكة، جفاف الجلد، طفح جلدي، احمرار)



معلومات

كقاعدة عامة، يقل معدل تكرار الآثار الجانبية وشدتها بعد الانتهاء من العلاج الكيميائي القائم على البلاتين.

* الآثار الجانبية التي حدثت لدى 10% على الأقل من المشاركين في الدراسة المحورية 1.

ماذا يمكنك أن تفعل بشأن الآثار الجانبية؟

الإسهال

- لتعويض فقدان السوائل، يجب أن تشرب من 2 إلى 4 لترات يوميًا.
- في حالة الإسهال الحاد، تناول الأطعمة سهلة الهضم (مثل الموز أو البطاطس المطهية).

الغثيان والقيء

- قد يصف لك فريق الرعاية الصحية المتابع لك أدوية لعلاج الغثيان والقيء (مضادات القيء).
- تناول كميات صغيرة على مدار اليوم.
- مصّ مصاصة فاكهة أو مكعب تلج.

التهاب الغشاء المخاطي الفموي

- اهتم بالعناية بالفم وفقًا لتوجيهات طبيبك.
- اشطف فمك على الأقل بعد كل وجبة بالماء أو الماء المالح (1-1/2 ملعقة صغيرة/لتر من الماء).

تغيرات في الجلد

- إذا كانت بشرتك جافة أو متشققة أو متقشرة، فاستخدمي منتجات مرطبة أو حتى منتجات للعناية بالبشرة تعمل على تجديد الزيوت خالية من العطور للمساعدة في منع تهيج الجلد الإضافي.

الإرهاق

- تساعد التمارين الرياضية والنشاط البدني على تقليل التعب والإرهاق. يُنصح بضبط منبه للتذكير بممارسة الحركة، والمشي يوميًا. تُعدّ النزهات القصيرة خيارًا مناسبًا.
- اقبل المساعدة التي يقدمها أصدقاؤك وعائلتك، أو اطلب الدعم في إدارة المهام الصعبة.

ما الذي أحتاج إلى معرفته أيضًا؟

- لا تتناول نبتة سانت جون (العرن المنقوب) خلال تناول عقار تاجريسو®.
- خلال العلاج بعقار تاجريسو®، يجب منع الحمل باستخدام وسيلة منع حمل فعّالة. أخبر طبيبك على الفور إذا كنت حاملاً، أو تعتقد أنك قد تكونين حاملاً، أو تخططين للحمل.
- لا توقف العلاج دون استشارة طبيبك.

الدعم الإضافي:

يمكن العثور على معلومات حول الخدمات الصيدلانية (استشارة الأدوية المتقدمة من قبل الصيدلية المشاركة) هنا:



يمكنك العثور على معلومات إضافية حول المرض هنا: www.lungenkrebs.de