



Arkuszyk informacyjny dla pacjentów

TAGRISO® (OZYMERTYNIB) + chemioterapia


Przyjmuje Pan/Pani lek TAGRISO® w skojarzeniu z chemioterapią. Poniżej znajduje się podsumowanie informacji na temat terapii oraz pomocne wskazówki dotyczące działań niepożądanych. Proszę zapoznać się również z informacjami dotyczącymi leku TAGRISO® zawartymi w ulotce dołączonej do każdego opakowania leku, jak również z ulotkami dołączonymi do leków chemioterapeutycznych.

Dlaczego przyjmuję TAGRISO® + chemioterapię?

Lek TAGRISO® mógł zostać Panu/Pani przepisany, ponieważ występujący u Pana/Pani rak płuc ma określoną cechę genetyczną (mutację). Dodatkowo otrzymuje Pan/Pani chemioterapię, ponieważ Pana/Pani stan zdrowia na to pozwala.

Jak działa terapia skojarzona?

Lek TAGRISO® jest przyjmowany w postaci tabletki (doustnie) raz na dobę. Chemioterapia składa się z dwóch składników: Pemetreksed i karboplatyna lub cisplatyna. Będzie Pan/Pani otrzymywać je dożylnie co trzy tygodnie. Chemioterapia oparta na pochodnych platyny z karboplatyną lub cisplatyną kończy się po maksymalnie czterech cyklach – tj. trzech miesiącach. Leczenie z zastosowaniem leku TAGRISO® i pemetreksedu są następnie kontynuowane w ramach tzw. terapii podtrzymującej.



Jak należy przyjmować lek TAGRISO®?



Należy przyjmować jedną tabletkę 80 mg raz na dobę. Tabletkę należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody. Nie rozgryzać, nie przełamywać ani **nie rozgniatać tabletki**.



Tabletkę należy przyjmować codziennie o tej samej porze.



Tabletkę można przyjmować niezależnie od posiłków.

Więcej informacji na temat przyjmowania leku TAGRISO® można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania.

Jaką dawkę leku TAGRISO® należy przyjmować?

Zalecana dawka to jedna tabletkę 80 mg raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zmniejszyć dawkę do jednej tabletki 40 mg raz na dobę.

Co mam zrobić, jeśli...

...zapomniałem(-am) przyjąć dawkę leku TAGRISO®?

- Należy zapisać datę.
- Jeśli następną dawkę należy przyjąć za ponad 12 godzin, pominiętą tabletkę należy przyjąć natychmiast po zauważeniu, że dawka została pominięta. Nie należy przyjmować tabletki, jeżeli termin przyjęcia kolejnej dawki przypada za mniej niż 12 godzin.
- Kolejną zaplanowaną dawkę należy przyjąć o zwykłej porze.

...przyjąłem/przyjęłam za dużo tabletek?

- Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Jakie są możliwe działania niepożądane?

Jak każdy lek, odpowiednie składniki terapii skojarzonej mogą wywoływać działania niepożądane, chociaż nie wystąpią one u każdego.

Należy poinformować lekarza w przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych objawów lub wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu, nawet jeśli wystąpią u Pana/ Pani działania niepożądane, które nie zostały wymienione tutaj lub w ulotce dołączonej do opakowania. Należy niezwłocznie powiadomić lekarza w przypadku zaobserwowania jednego lub więcej z następujących działań niepożądanych:

- Nagła duszność z kaszlem i gorączką
- Czerwonawe przebarwienia skóry przypominające tarczę lub okrągłe plamy, łuszczenie się skóry lub owrzodzenia, które mogły być poprzedzone gorączką i objawami grypopodobnymi
- Szybkie lub nieregularne bicie serca, zawroty głowy, uczucie oszołomienia, ucisk w klatce piersiowej, duszność lub omdlenie
- Łzawienie oczu, nadwrażliwość na światło, ból oczu, zaczerwienienie oczu lub zaburzenia widzenia
- Utrzymująca się gorączka, siniaki lub zwiększona skłonność do krwawień, narastające zmęczenie
- Duszność, zmęczenie, oraz obrzęk kostek.

Pełen wykaz wszystkich znanych działań niepożądanych można znaleźć w ulotce dołączonej do każdego produktu.

Bardzo częste działania niepożądane terapii skojarzonej*



Biegunka, nudności lub wymioty



Zapalenie jamy ustnej (stan zapalny i owrzodzenie błony śluzowej jamy ustnej)



Zmęczenie



Utrata apetytu



Zmniejszenie liczby płytek krwi i białych krwinek (leukocytów, limfocytów lub neutrofilii), niedokrwistość, zwiększenie aktywności enzymów wątrobowych AST i ALT oraz zwiększenie stężenia kreatyniny we krwi



Zaburzenia skóry i paznokci (ból, świąd, suchość skóry, wysypka, zaczerwienienie)

Informacje

Co do zasady, częstość występowania i nasilenie działań niepożądanych zmniejszają się po zakończeniu chemioterapii opartej na pochodnych platyny.

* Działania niepożądane, które wystąpiły u co najmniej 10% uczestników badania głównego.¹

Co mogę zrobić w związku z działaniami niepożądanymi?

Biegunka

- Aby zrekompensować utratę płynów, należy pić 2-4 litry dziennie.
- W przypadku ostrej biegunki należy spożywać pokarmy łatwostrawne (np. banany lub gotowane ziemniaki).

Nudności i wymioty

- Lekarz może przepisać leki przeciw nudnościom i wymiotom (leki przeciwwymiotne).
- Należy jeść małe porcje przez cały dzień.
- Można ssać owocowy lód wodny na patyku lub kostkę lodu.

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

- Należy pielęgnować jamę ustną zgodnie z zaleceniami lekarza.
- Usta należy płukać co najmniej po każdym posiłku wodą lub słoną wodą (½-1 łyżeczki/litr wody).

Zmiany skórne

- Jeśli skóra jest sucha, popękana lub łuszczy się, należy używać nawilżających lub nawet natłuszczających produktów do pielęgnacji skóry, które nie zawierają substancji zapachowych, aby nie dopuścić do dodatkowego podrażnienia skóry.

Zmęczenie

- Ćwiczenia i aktywność fizyczna pomagają zmniejszyć zmęczenie i wyczerpanie. Warto ustawić „alarm ruchu” i codziennie wychodzić na spacer. Krótkie spacerki w zupełności wystarczą.

- Warto przyjmować pomoc oferowaną przez przyjaciół i członków rodziny lub poprosić o wsparcie w radzeniu sobie z trudnymi zadaniami.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

- Nie należy przyjmować dziurawca zwyczajnego (*Hypericum perforatum*) podczas stosowania leku TAGRISSO®.
- Podczas leczenia lekiem TAGRISSO® należy zapobiegać ciąży, stosując skuteczną antykoncepcję. Należy niezwłocznie poinformować lekarza, jeśli jest Pani w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje zajść w ciążę.
- Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Dodatkowe wsparcie:

Informacje na temat usług farmaceutycznych (zaawansowana konsultacja dotycząca leków w aptece uczestniczącej w programie) można znaleźć tutaj:



Dodatkowe informacje na temat choroby można znaleźć tutaj: www.lungenkrebs.de