



Arkusz informacyjny dla pacjentów

TAGRISO® (ozymertynib)

Lek TAGRISO® został Panu/Pani przepisany przez lekarza. Niektóre przydatne informacje na temat przyjmowania TAGRISO® podsumowano poniżej. Proszę zapoznać się również z informacjami dotyczącymi leku TAGRISO® zawartymi w ulotce dołączonej do każdego opakowania leku.

Dlaczego przepisano mi lek TAGRISO®?

Lek TAGRISO® został Panu/Pani przepisany, ponieważ występujący u Pana/Pani rak płuc ma określoną cechę genetyczną – tzw. mutację EGFR.

Jak należy przyjmować lek TAGRISO®?



Należy przyjmować jedną tabletkę 80 mg raz na dobę. Tabletkę należy połykać w całości, popijając dużą ilością wody. Nie rozgryzać, nie przełamywać ani nie rozgniatać tabletki.



Tabletkę należy przyjmować codziennie o tej samej porze.



Tabletkę można przyjmować niezależnie od posiłków.

Więcej informacji na temat prawidłowego przyjmowania leku TAGRISO® oraz leków, których nie należy przyjmować razem z lekiem TAGRISO®, można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania.

Dlaczego tak ważne jest regularne przyjmowanie leku?

Wczesne stadia: Nawet po zabiegu chirurgicznym, chemioterapii lub radioterapii pojedyncze komórki nowotworowe mogą pozostać w organizmie. Regularne przyjmowanie leku TAGRISO® pomaga opóźnić nawrót choroby poprzez ograniczanie jej aktywności.

Stadia zaawansowane: Celem jest jak najdłuższe spowolnienie wzrostu guza poprzez stosowanie leków oraz utrzymanie jak najlepszej jakości życia.

Jaką dawkę leku TAGRISO® należy przyjmować?

Zalecana dawka to jedna tabletkę 80 mg raz na dobę. W razie potrzeby lekarz może zmniejszyć dawkę do jednej tabletki 40 mg raz na dobę.

Jak należy przechowywać lek TAGRISO®?

Lek należy przechowywać w miejscu niedostępnym dla dzieci. Nie są wymagane specjalne warunki przechowywania.

Co należy zrobić w przypadku...

...pominięcia dawki leku?

- Należy zapisać datę.
- Jeśli do przyjęcia kolejnej dawki pozostało więcej niż 12 godzin, należy przyjąć pominiętą tabletkę niezwłocznie po przypomnieniu sobie o niej. Nie należy przyjmować tabletki, jeżeli termin przyjęcia kolejnej dawki przypada za mniej niż 12 godzin.
- Należy przyjąć kolejną dawkę o zwykłej porze.

...przyjęcia zbyt wielu tabletek?

- Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem lub najbliższym szpitalem.

Co jeszcze muszę wiedzieć?

- Nie należy przyjmować dziurawca zwyczajnego (*Hypericum perforatum*) podczas stosowania leku TAGRISO®.
- Podczas leczenia lekiem TAGRISO® należy zapobiegać ciąży, stosując skuteczną antykoncepcję. Należy natychmiast poinformować lekarza, jeśli jest Pani w ciąży, podejrzewa, że może być w ciąży lub planuje mieć dziecko.
- Nie należy przerywać leczenia bez konsultacji z lekarzem.

Jakie są możliwe działania niepożądane?

- Jak każdy produkt leczniczy, ten lek może powodować działania niepożądane, chociaż nie u każdego pacjenta one wystąpią.
- Należy poinformować lekarza w przypadku zauważenia jakichkolwiek nietypowych objawów lub wystąpienia jakiegokolwiek dyskomfortu, nawet jeśli wystąpią u Pana/Pani działania niepożądane, które nie zostały wymienione tutaj lub w ulotce dołączonej do opakowania.
- Należy niezwłocznie skontaktować się z lekarzem, zwłaszcza jeśli wystąpi nagle duszność wraz z kaszlem i gorączką, ponieważ mogą to być objawy zapalenia płuc.

Pełen wykaz wszystkich znanych działań niepożądanych można znaleźć w ulotce dołączonej do opakowania.

Poniżej wymieniono bardzo częste działania niepożądane leku TAGRISSO®:1



biegunka;



zapalenie jamy ustnej (stan zapalny błony śluzowej jamy ustnej);



utrata apetytu;



swędząca skóra;



zaburzenia skóry i paznokci (ból, suchość skóry, wysypka, zaczerwienienie).

Co mogę zrobić samodzielnie, aby kontrolować działania niepożądane?

Ważne jest, aby zgłaszać wszelkie działania niepożądane zespołowi medycznemu. Dzięki temu może Pan/Pani otrzymać odpowiedni lek wspomagający i kontynuować swoje leczenie tak jak zwykle. Oprócz leków może Pan/Pani również samodzielnie wypróbować zastosowanie kilku wskazówek.

Biegunka

- Aby uzupełnić utracone płyny, należy pić 2–4 litry dziennie. Odpowiednie będą na przykład: woda, niesłodzone herbaty, wywary warzywne oraz napoje elektrolitowe.
- W przypadku ostrej biegunki należy spożywać pokarmy łatwostrawne (takie jak banany lub gotowane ziemniaki) w małych porcjach.

Zapalenie błony śluzowej jamy ustnej

- Należy postępować zgodnie z zaleceniami lekarza dotyczącymi higieny jamy ustnej.
- Do mycia zębów należy używać szczoteczki z miękkim włosiem.
- Usta należy płukać co najmniej po każdym posiłku wodą lub słoną wodą (1/2–1 łyżeczki/litr wody).

Utrata apetytu

- Należy jeść kilka małych posiłków dziennie. Zimne potrawy i zimne napoje są często łatwiejsze do trawienia.
- Należy zawsze spożywać wystarczającą ilość kalorii. Pomocne może być śledzenie dziennego spożycia kalorii za pomocą aplikacji lub dzienniczka.

Zmiany skórne i świąd

- Jeśli skóra jest sucha, popękana lub łuszczy się, należy używać nawilżających lub nawet zmiękczających preparatów do pielęgnacji skóry, które nie zawierają substancji zapachowych, aby nie podrażniały one dodatkowo skóry.
- Nie należy zbyt często myć skóry i należy używać tylko letniej wody i łagodnych balsamów bez mydła.

Zaburzenia paznokci

- Balsam do paznokci może mieć działanie odżywcze i ochronne.
- W przypadku zapalenia łożyska paznokcia można wspomóc gojenie, mocząc paznokcie w letniej wodzie z dodatkiem mydła szarego lub jodopowidonu o działaniu przeciwbakteryjnym.
- Nie należy obcinać paznokci u rąk i nóg zbyt krótko ani „na okrągło” – należy obcinać je „na prosto”, aby nie wrastały.

Dodatkowe wsparcie:

Pacjenci, którzy, tak jak Pan/Pani, przyjmują leki przeciwnowotworowe w postaci tabletek, mogą skorzystać z konsultacji w aptece. Jest to tak zwana **usługa farmaceutyczna**, w ramach której można omówić z farmaceutą sposoby na usprawnienie stosowania leku.

Listę uczestniczących aptek można znaleźć na stronie: www.apoguide.de



Dodatkowe informacje na temat choroby można znaleźć tutaj: www.lungenkrebs.de